


## SABER MÁS..... MARZO 2015

PARA TODO EL QUE QUIERA AYUDAR Y APORTAR DATOS. Sería muy interesante para poder intentar reducir los daños en trufas conocer mejor el ciclo biológico.

- Fecha en que se han visto los últimos adultos.
- Fecha (después del verano) que se ha observado los primeros adultos y larvas.
- Hora de vuelo (después del verano) de los adultos.



### IDEAS PARA INTENTAR REDUCIR LA POBLACION

( Hasta que sea posible usar trampas con atrayentes para capturar adultos sobre todo hembras. )

#### ALGUNA IDEA

- Extraer todas las trufas posibles especialmente en Septiembre y Octubre
- Colocar las trampas PLP o PLP en zona donde hemos cogido las trufas muy afectadas ya que quedan adultos que por la noche salen al exterior. Por ejemplo si colocamos 20 trampas en la zona más afectada de la parcela y la cambiamos cada vez que vayamos a buscar trufas podemos reducir los adultos. 20 TRAMPAS X 8 ADULTOS X 40 VISITAS = 6400 adultos.

SI AMPLIAMOS EL NÚMERO DE TRAMPAS

**277 plantas / ha**

**Productoras:**

**150 plantas X 1 trampa X 8 adultos X 40 visitas = 48000 adultos**

SABER MÁS..... MARZO 2015

